ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

© Шаркунова Анна Валерьевна, Миколайчук Виктория Анатольевна, Мамедли Саялы Асад кызы, Скворцова Татьяна Эдуардовна

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова.
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

E-mail: mangust16031996@mail.ru

Ключевые слова: дивертикулярная болезнь; осложнения; дивертикулит; перфорация.

ВВЕДЕНИЕ

Дивертикулярная болезнь толстой кишки — распространенное заболевание, протекающее часто бессимптомно, что затрудняет выявление данной патологии. Данное заболевание имеет ряд осложнений, требующих хирургического вмешательства.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить характер и частоту осложнений пациентов с дивертикулярной болезнью толстой кишки, поступивших в стационар с диагнозом острый живот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обработаны 83 истории болезни пациентов хирургического отделения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в период с 2007 по 2017 гг. с диагнозом дивертикулярной болезни толстой кишки, из них женщин — 56 человек (67%), мужчин- 27 (33%). Средний возраст женщин составил 68±13,5 лет, мужчин — 50±18,5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

18% пациентов составляли возрастную группу до 40 лет, 7% — 40–49 лет, 7% — 50–59 лет, 52% — 60–79 лет, 16% — старше 80 лет. По локализации дивертикулов пациенты распределились следующим образом: в слепой кишке — 1%, восходящей ободочной — 1%, нисходящей ободочной — 3%, поперечно-ободочной — 4%, сигмовидной кишке — 37%, сигмовидной кишке и нисходящей ободочной — 12%, на все протяжении толстой кишки — 37%. Осложнения дивертикулярной болезни наблюдались в 50% случаев: из них 24% — острый дивертикулит, 5% — кровотечение из дивертикула, 1% — кишечная непроходимость, в 7% случаев острый дивертикулит сопровождался перитонитом, у 13% пациентов острый дивертикулит осложнился перфорацией с последующим развитием перитонита у 8% больных. Всем пациентам с осложнениями дивертикулярной болезни проведено хирургическое лечение.

ВЫВОДЫ

Частота встречаемости дивертикулярной болезни у мужчин и женщин — 1: 2. В основном данным заболеванием страдают лица от 60 до 79 лет (52%). Наиболее частым осложнением является острый дивертикулит. Перфорация дивертикула в сочетании с разлитым перитонитом привела к 2 летальным исходам.