КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

© *Тухтаева Олмахон Ташевна*

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент. Узбекистан. E-mail tashevna6902@gmail.com

Ключевые слова: бронхиальная астма; дети; клинические симптомы

Введение. Бронхиальная астма является одной из важнейших проблем современной медицины. В последние десятилетия во всех странах мира, в том числе Республике Узбекистан, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости детей бронхиальной астмой (БА) и их более тяжелому течению.

Цель исследования. Изучить клинические проявления бронхиальной астмы у детей.

Материалы методы. Под нашим наблюдением находились 32 больных с различными степенями бронхиальной астмы в возрасте от 3х до 18 лет находившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении ГДКБ №1. Изучены клинические симптомы у детей с бронхиальной астмой с легкой интермиттирующей (n=11), легкой персистирующей (14), **средней** персистирующей (n=6), и тяжелой персистирующей ступени (n=4). Диагноз БА установливался по клиническим, физикальным, и по показателям ПСВ. Клиническое обследование проводилось с использованием общепринятых физикальных методов.

Результаты исследования. Наши наблюдения показали, что у 25% (8) детей при бронхиальной астме I легкой интермиттирующей ступени клинические дневные симптомы проявлялся реже 1 раз в неделю, короткие обострения, ночные симптомы наблюдалось 1-2 раза в месяц.

У 44% (14) больных с II легкой персистирующей ступени дневные симптомы наблюдалось 2–5 раза в неделю, но реже 1 раза в день, ночные симптомы 2–4 раз в месяц (реже 1 раза в неделю). Во время обострения наблюдалось нарушение сна у детей и физической активности.

У 19% (6) больных при III средней персистирующей ступени ежедневные симптомы (чаще 5 раз в неделю), Ночные симптомы чаще 1 раза в неделю.

При тяжелой персистирующей ступени 13% (4) больных ежедневные симптомы частые обострения, частые ночные приступы, ограничение физической активности.

Выводы. При изучении клинических проявлений БА у детей выявлено, что бронхиальная астма у детей сопровождается яркими клиническими проявлениями; острая обструкция дыхательных путей клинически проявлялся однотипно — остро возникшей экспираторной одышкой в виде шумного дыхания с удлиненным выдохом, вздутием грудной клетки и втяжением ее уступчивых мест, навязчивым кашлем, вариабельными диффузными сухими и разного калибра влажными хрипами в легких. В генезе обструкции бронхов ведущую роль играет спастический компонент аллергического характера.